

Violences faites aux femmes : facteurs prédictifs de repérage précoce. Etude cas-témoins au Service d'Accueil des Urgences du CHAL (74) en 2015.



Journée du RENA U 2019
13 juin 2019



D. VERNUDACHI, M. NOLLET, I. REVIL,
K. TAZAROURTE, FX. AGERON

Rationnel de l'étude et objectif

- 1 décès tous les 3 jours
- Problème de santé publique
- Dépistage systématique recommandé
- Soignants : 1^{er} interlocuteur
- Objectifs :
 - ➔ Identification de facteurs prédictifs
 - ➔ Dépistage ciblé et précoce
 - ➔ Diminution de la morbi-mortalité

Matériel et méthode (1/2)

- Etude cas témoins, monocentrique, rétrospective
- Entre le 01/02/2015 et le 31/12/2015
- Inclus :
 - cas : consultantes > 15 ans identifiées « violences conjugales » (outcome)
 - témoins : sélection au hasard
- Exclus : hommes, violences extra-conjugales

Matériel et méthode (2/2)

- Données démographiques, sociales, lésionnelles
- Anonymisation
- Déclaration à la CNIL
- Statistiques:
 - Sélection des variables par LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selecting Operator)
 - Modèle multivarié par régression logistique (avec test des interactions plausibles)

Résultats

	Cas N=122 N (%)	Témoins N=189 N (%)	Analyse multivariée OR (IC 95%)	p-value
Age moyen (écart-type)	35 (12)	37 (13)	0.9 (0.8-0.9)	0.006
Statut marital n, %)				
Célibataire	22 (18)	77 (41)	1	
Mariée / concubinage ou divorcée	100 (82)	112 (59)	21.1 (6.1-75.8)	<0.001
RSA ou AME ou CMU (n, %)	16 (13)	32 (17)	0.1 (0.0-0.5)	0.003
CSP +	21 (17)	11 (6)	2.6 (0.6 -11.5)	0.188
Non maîtrise de la langue	5 (4)	2 (1)	71.1 (1.5- ∞)	0.030
Maladie mentale	18 (15)	21 (11)	2.9 (0.7-11.9)	0.148
Handicap	8 (7)	6 (3)	30.0 (2.6- ∞)	0.011
Addiction alcool	11 (9)	6 (3)	11.2 (1,8-70,8)	0.010
Consultation en garde ou nuit profonde	72 (59)	78 (41)	4.9 (2.0-12.2)	<0.001
Consultation pour un traumatisme physique	106 (88)	38 (20)	91.1 (29.9-∞)	<0.001

Portrait-robot



©AFP

- Femme jeune
- Mariée ou en concubinage ou divorcée
- Sans suivi social
- Précaire (non maîtrise de la langue)
- Pouvant être CSP +
- Avec un handicap physique ou mental
- Avec des problèmes d'éthylisme chronique
- Consultant en période de garde, en nuit profonde
- Pour un motif traumatologique

Discussion

- Limites
 - Validité interne
 - Validité externe
- Biais de sélection
- Formation
- Etudes futures d'impact

Merci de votre attention.

